

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ODONTOIATRIA PEDIATRICA  
A.A. 2023/2024  
COMPITO B - CORRETTORE

La dentina ricopre:

- a) la corona del dente
- b) la polpa dentaria**
- c) la radice del dente
- d) il legamento paradontale

L'ipoplasia è un difetto dello smalto di tipo:

- a) qualitativo
- b) quantitativo**
- c) genetico
- d) funzionale

La quantità di fluoro presente in un dentifricio al fluoro è circa:

- a) 1450 ppm**
- b) 22600 ppm
- c) 80000 ppm
- d) 100000 ppm

Il primo molare permanente:

- a) mantiene il perimetro dell'arcata
- b) sostiene i carichi masticatori massimi
- c) è un fattore chiave per l'occlusione
- d) tutte le precedenti**

L'assenza totale di sviluppo dei denti è chiamata:

- a) microdonzia
- b) anodonzia**
- c) oligodonzia
- d) macrodonzia

L'unione dei denti solo tramite il cemento è chiamata:

- a) geminazione
- b) perla dello smalto
- c) fusione
- d) concrescenza**

Quanti sono i denti permanenti per emiarcata esclusi i denti del giudizio?

- a) 28**
- b) 8
- c) 7
- d) 6

Cosa va a valutare la sesta chiave di Andrews?

- a) relazioni interarcata
- b) curva di Spee**
- c) inclinazione delle corone
- d) punti di contatto

Dopo avulsione traumatica dei denti decidui, questi:

- a) devono essere reimpiantati solo se il dente permanente sottostante non è ancora in fase eruttiva
- b) devono essere sempre reimpiantati indipendentemente dalla fase di eruzione del permanente corrispondente
- c) **non dovrebbero essere reimpiantati**
- d) devono essere reimpiantati solamente se si tratta dei molaretti di latte

In un paziente con respirazione orale cronica, l'esame clinico evidenzia:

- a) profilo convesso, faccia corta, arcata stretta
- b) profilo convesso, faccia lunga, arcata ampia
- c) **profilo convesso, faccia lunga, arcata stretta**
- d) profilo convesso, faccia corta, arcata ampia

La malocclusione di II classe scheletrica 1 divisione è caratterizzata da:

- a) morso aperto posteriore
- b) morso aperto laterale
- c) overjet diminuito
- d) **overjet aumentato**

Un bambino di 8 anni dovrebbe avere:

- a) 20 denti
- b) **24 denti**
- c) 16 denti
- d) 28 denti

L'ortopantomografia delle arcate dentarie permette di:

- a) **identificare le anomalie dentarie di sviluppo, di forma, di posizione, di numero**
- b) identificare lesioni della mucosa
- c) diagnosticare accuratamente la carie interprossimale
- d) diagnosticare accuratamente la carie oclusale

In caso di elemento dentario incluso, la metodica radiologica più utile per la pianificazione chirurgica è:

- a) TC con mezzo di contrasto
- b) RMN
- c) **CBCT**
- d) ecografia

La lesione caratteristica dell'herpes labiale è rappresentata da:

- a) **vescicole disposte a grappolo**
- b) strie biancastre ad andamento anulare
- c) papule di colore rosso cupo
- d) afte

Le afte si ritrovano frequentemente:

- a) nella mucosa vestibolare
- b) nel pavimento orale
- c) nel palato molle
- d) **tutte le risposte precedenti sono corrette**

La diagnosi differenziale del lichen atrofico va fatta con:

- a) gengivostomatite erpetica primaria
- b) **eritroplachia**
- c) lichen reticolare
- d) leucoplachia

Con il termine di glossite migrante si fa riferimento a:

- a) **lingua a carta geografica**
- b) glossite losangica mediana
- c) lingua scrotale
- d) lingua crenata

Le strie di Wickham sono caratteristiche:

- a) della leucoplachia
- b) **del lichen ruber planus**
- c) del pemfigo
- d) dello smalto

I molari decidui hanno:

- a) **superfici di contatto**
- b) punti di contatto
- c) diastemi
- d) nessuna delle precedenti

Quale tra le seguenti è un'anomalia di posizione:

- a) **rotazione**
- b) ectopia
- c) trasposizione
- d) eterotopia

In dentatura decidua, gli incisivi formano sul piano sagittale un angolo che varia:

- a) tra  $70^\circ$  e  $90^\circ$
- b) tra  $110^\circ$  e  $130^\circ$
- c) tra  $90^\circ$  e  $100^\circ$
- d) **tra  $170^\circ$  e  $180^\circ$**

Il dotto di Wharton si apre in corrispondenza:

- a) **della caruncola sottolinguale**
- b) del vestibolo della bocca in corrispondenza del secondo molare superiore
- c) del vestibolo della bocca in corrispondenza del primo molare superiore
- d) nessuna delle precedenti affermazioni è corretta

La suzione prolungata del dito pollice può determinare la comparsa di:

- a) una protrusione degli incisivi superiori
- b) una lingualizzazione degli incisivi inferiori
- c) morso aperto
- d) **tutte le precedenti**

Quali tra le seguenti patologie orali è definita anche mughetto:

- a) leucoplachia capelluta
- b) **candidosi acuta pseudomembranosa**
- c) pemfigo volgare
- d) lichen a placca

In seguito a trauma dentale è possibile avere:

- a) mobilità dentale
- b) parziale o completa oblitterazione della camera pulpare
- c) necrosi pulpare
- d) **tutte le risposte precedenti sono corrette**

L'agente eziologico della gengivostomatite erpetica è:

- a) **herpes simplex**
- b) papillomavirus
- c) virus di Epstein-Barr
- d) Citomegalovirus

Il trigemino è un nervo:

- a) motore
- b) sensitivo
- c) **misto**
- d) sensoriale

Indicare quale tra le seguenti è un disordine potenzialmente maligno:

- a) **eritroplachia**
- b) herpes labiale
- c) fibroma
- d) afta

Di norma, il completamento della dentizione decidua dovrebbe avvenire a:

- a) 12 mesi
- b) 18 mesi
- c) 24 mesi
- d) **36 mesi**

In caso di ECC ( Early Childhood Caries), le prime lesioni cariose si evidenziano su:

- a) **superficie vestibolare degli incisivi superiori**
- b) superficie linguale degli incisivi inferiori
- c) sia A che B
- d) né A né B

Che cosa sono le cisti radicolari?

- a) cisti di sviluppo
- b) cisti da ritenzione
- c) **cisti di origine infiammatoria**
- d) cisti traumatiche

Un trauma sul dente deciduo può determinare a carico del corrispondente permanente:

- a) displasie dello smalto
- b) malformazioni della corona e della radice
- c) nessuna delle precedenti
- d) **entrambe le precedenti**

La ranula si localizza nel:

- a) **pavimento orale**
- b) vestibolo orale
- c) palato molle
- d) prolabio inferiore

Il primo dente permanente erompe di norma all'età di:

- a) **6 anni**
- b) 10 anni
- c) 3 anni
- d) 9 anni

Le vernici al fluoro con 22.500 ppm:

- a) possono essere utilizzate quotidianamente
- b) sono acquistabili in forma di dentifricio
- c) possono essere applicate solo sui denti decidui
- d) **vanno applicate professionalmente ogni 3-6 mesi**

Gli spazi di Baume nel mascellare sono tra:

- a) **Incisivo laterale deciduo e canino deciduo**
- b) Canino deciduo e primo molare deciduo
- c) Incisivo centrale deciduo e incisivo laterale deciduo
- d) Incisivo centrale deciduo e canino deciduo

A 8 anni quanti denti ha un bambino generalmente in cavità orale:

- a) 10 denti
- b) 20 denti
- c) **24 denti**
- d) 32 denti

La dentatura decidua si completa a:

- a) 6 mesi
- b) 12 mesi
- c) **36 mesi**
- d) 72 mesi

Il primo elemento permanente ad erompere è:

- a) l'incisivo centrale superiore
- b) il canino superiore
- c) **il primo molare inferiore**
- d) il canino inferiore

Quale dei seguenti difetti non è un difetto di numero?

- a) anodonzia
- b) ipodonzia
- c) **microdonzia**
- d) iperdonzia

Un molare con le radici corte e una camera pulpale ampia e allungata è caratteristico:

- a) dell'ipercementosi
- b) del dens invaginatus
- c) **del taurodontismo**
- d) dell'odontodisplasia regionale

Il Dens in dente è più comunemente osservato in:

- a) premolari
- b) **incisivi laterali**
- c) canini
- d) primi molari decidui

La disodontiasi è:

- a) un'anomalia di volume
- b) un'anomalia di forma
- c) un'anomalia di eruzione**
- d) un'anomalia di struttura

La seconda fase di permuta dentaria di norma va:

- a) dai 9-10 ai 12-13 anni**
- b) dai 7 ai 9 anni
- c) dai 5 ai 7 anni
- d) dai 14 anni ai 15

Quanti denti decidui formano la dentatura decidua completa:

- a) 5
- b) 10
- c) 20**
- d) 30

Cosa va a valutare la terza chiave di Andrews?

- a) relazioni interarcata
- b) curva di Spee
- c) inclinazione delle corone**
- d) punti di contatto

Nei pazienti a rischio di endocardite infettiva, la profilassi antibiotica deve essere effettuata per:

- a) sigillatura di molari
- b) visite di controllo
- c) igiene orale professionale**
- d) applicazione topica di fluoro

L'igiene orale nei bambini va praticata a partire:

- a) dalla comparsa del primo dente in arcata**
- b) dall'eruzione completa di tutti i denti decidui
- c) dall'eruzione degli incisivi permanenti
- d) da 10 anni in poi

La priorità di trattamento ortodontico in dentatura decidua è:

- a) affollamento dentario
- b) morso inverso**
- c) rotazioni dentarie
- d) infraocclusione

La carie in dentatura decidua a 4 anni ha una prevalenza del:

- a) 51%
- b) 72%
- c) 22%**
- d) 1%

La radice del dente è ricoperta da:

- a) smalto
- b) cemento**
- c) cartilagine
- d) dentina

Qual è antibiotico di prima scelta nella terapia dell'ascesso odontogeno:

- a) sempre le penicilline
- b) sempre i macrolidi
- c) sempre le cefalosporine
- d) penicilline o, in caso di allergia a queste, macrolidi**

L'Early Childhood Caries è :

- a) manifestazione precoce della lesione cariosa in bambini di età inferiore ai 6 anni**
- b) manifestazione della malattia cariosa degli adolescenti
- c) manifestazione della malattia cariosa degli adulti
- d) manifestazione della malattia cariosa che si sviluppa negli anziani

Le classi di Black definiscono:

- a) la localizzazione della carie**
- b) l'occlusione dentale statica
- c) l'occlusione dentale dinamica
- d) le malocclusioni

Quale tra queste patologie è causa della riduzione del flusso salivare:

- a) sindrome di Sjogren**
- b) eritema multiforme
- c) reflusso gastro-esofageo
- d) tutte le precedenti

Quali delle seguenti sono la causa di perdita di spazio in arcata?

- a) perdita prematura dei denti decidui
- b) lesioni cariose prossimali non restaurate
- c) agenesie dei denti decidui
- d) tutte le cause precedenti**

La lesione traumatica ad un incisivo deciduo che dà più frequentemente complicanze al permanente di sostituzione è:

- a) lussazione intrusiva**
- b) frattura della corona
- c) concussione
- d) estrusione

Il numero totale di denti aumenta in caso di:

- a) geminazione**
- b) fusione
- c) concrescenza
- d) tutte le precedenti

I denti sovranumerari:

- a) hanno morfologia atipica**
- b) sono sempre inclusi
- c) sono presenti solo in dentatura decidua
- d) sono presenti solo in dentatura permanente

Un'angolazione anomala della radice o della corona del dente è chiamata:

- a) esostosi
- b) dilacerazione**
- c) angolazione
- d) nessuna delle precedenti

Quale di queste metodiche non utilizza radiazioni ionizzanti:

- a) OPT
- b) CBCT
- c) Scintigrafia
- d) **RM**

La Molar Incisor Hypomineralization (MIH):

- a) colpisce solo i soggetti di sesso maschile
- b) colpisce sempre tutti i molari permanenti
- c) colpisce solo gli incisivi permanenti
- d) **ha un'etiologia multifattoriale**

Le ipoplasie dello smalto:

- a) **sono lesioni correlate allo stadio di sviluppo del dente in relazione a quando agisce la noxa patogena**
- b) avvengono sempre dopo l'eruzione del dente in arcata
- c) interessano esclusivamente la quinta e la sesta decade di vita
- d) interessano solo i molari permanenti

Il termine granuloma si riferisce a:

- a) tumore benigno dei granulociti
- b) **lesione infiammatoria cronica**
- c) tumore embrionario
- d) aumento di granuli lisosomiali

La concentrazione di acido ortofosforico usato per il mordenzante è di solito:

- a) meno del 10%
- b) 10-20%
- c) **30-50%**
- d) 70-80%

La cheilite attinica acuta interessa:

- a) la commissura labiale
- b) **il labbro inferiore con esclusione della commissura labiale**
- c) il labbro inferiore compresa la commissura labiale
- d) il labbro superiore

L'uso della diga di gomma offre i seguenti vantaggi:

- a) protezione delle mucose
- b) protezione del paziente
- c) controllo della saliva
- d) **tutte le precedenti**

Il parodonto è costituito da:

- a) **gengiva, cemento radicolare, osso alveolare, legamento parodontale**
- b) osso alveolare e cemento radicolare
- c) legamento parodontale e osso alveolare
- d) cemento radicolare e gengiva

Lo smalto dentario è di origine:

- a) endodermica
- b) mesodermica
- c) **ectodermica**
- d) nessuna delle precedenti